

RACCOMANDAZIONI PER DIETE

SPECIFIC™ PER CANI

	CONDIZIONE	DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*
A	▶ Allergia	
	▶ Allergia/intolleranza alimentare	CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CID-LF, CIW-LF
	▶ Atopia, allergia alle pulci	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Combinazioni di allergie	CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Anoressia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Ascite	CKD, CKW
	▶ Asma	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Atopia	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
B	▶ Uroliti vescicali: dissoluzione	
	▶ Struvite	CCD
	▶ Urati	CKD, CKW
	▶ Uroliti vescicali: riduzione delle recidive	
	▶ Cistina	CKD, CKW
	▶ Ossalato	CKD, CKW
	▶ Struvite	CCD
	▶ Urati	CKD, CKW
C	▶ Cachessia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Cancro	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Insufficienza cardiaca	
	▶ con insufficienza renale concomitante	CKD, CKW
	▶ senza insufficienza renale concomitante	CΩD
	▶ Colestasi	CID-LF, CIW-LF, CRD-1, CRD-2, CGD
	▶ Diarrea cronica	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, -HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Colite	CΩD-HY, CΩW-HY, CΩD, CRD-1, CRD-2, CRW-1, CDW, CDD-HY, CID, CIW, CID-LF, CIW-LF,
	▶ Stipsi	CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Convalescenza	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CID, CIW, CΩD
	▶ Distrofia corneale	CRD-1, CRD-2
	▶ Terapia intensiva	F/C-IN-W, F/C-IN-L,
	D	▶ Diabete mellito
▶ Diarrea		CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
▶ Intolleranza/allergia alimentare		CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
E	▶ Insufficienza di pancreas esocrina	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, , CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
F	▶ Flatulenza	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, , CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Allergia/intolleranza alimentare	CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CID-LF, CIW-LF

CONDIZIONE		DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*
G	▶ Disturbi gastrointestinali	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
H	▶ Insufficienza cardiaca	
	con insufficienza renale concomitante	CKD, CKW
	senza insufficienza renale concomitante	CΩD
	▶ Iperlipidemia	CID-LF, CIW-LF, CRD-1, CRD-2, , CΩW-HY
	▶ ipertensione	CKD, CKW, CΩD
I	▶ IBD	CΩD-HY, CΩW-HY, CΩD, CDW, CDD-HY, CID, CIW, CID-LF, CIW-LF
	▶ Supporto intensivo	F/C-IN-W, F/C-IN-L
	▶ Infiammazione	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
J	▶ Supporto delle articolazioni e della mobilità	CJD
K	▶ Insufficienza renale	CKD, CKW
L	▶ Insufficienza epatica	CKD, CKW
M	▶ Malassorbimento	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Maldigestione	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Mobilità e supporto articolare	CJD
	▶ Edema	CKD, CKW
O	▶ Peso in eccesso	
	Weight Reduction	CRD-1, CRW-1
	Controllo del peso	CRD-2, CRW-1
P	▶ Insufficienza pancreatica	
	Esocrina	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, , CDW, -HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	Endocrina	CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Pancreatite	CID-LF, CIW-LF, CID, CIW, , CXD, CGD, CJD, CRD-2, CDD-HY, CΩW-HY
	▶ Pancreatite con iperlipidemia	CID-LF, CIW-LF
	▶ Pancreatite con DM	CRD-2
R	▶ Convalescenza	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CID, CIW, CΩD
	▶ Insufficienza renale	CKD, CKW

	CONDIZIONE	DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*
S	▶ Malattia cutanea dovuta a:	
	Allergia/intolleranza alimentare	CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	Combinazione di allergie	CΩD-HY, CΩW-HY
	Atopia	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	Altra causa	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY, CXD
	▶ Stress	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
U	▶ Chirurgia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CID, CIW, CAD, CΩD,
	▶ Sottopeso	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Uremia	CKD, CKW
U	▶ Urolitiasi: dissoluzione	
	Struvite	CCD
	Urati	CKD, CKW
	▶ Urolitiasi: riduzione delle recidive	
	Cistina	CKD, CKW
	Ossalato	CKD, CKW
	Struvite	CCD
	Urati	CKD, CKW
V	▶ Vomito	CID, CIW, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY

[CLICCA QUI PER LA PAGINA DEI CONTENUTI](#)

* Raccomandazione per diete SPECIFIC™ che possono aiutare a supportare il fabbisogno di sostanze nutritive di questi cani. **Per alcune condizioni sono elencate diverse diete SPECIFIC™. In questi casi, vengono elencate per prime le diete più comunemente raccomandate per la condizione specifica.** Tuttavia, la scelta della dieta più ottimale può essere influenzata da diversi fattori e deve essere determinata per ogni singolo cane.